

Aus der Heilstätte Rheinland der L.V.A. Hohenhonnet (Rhein).

Chefarzt: Dr. med. H. Schulte-Tigges. *)

Experimentelle Untersuchungen über den Oleo thorax.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

H o h e n M e d i z i n i s c h e n F a k u l t ä t

der

**Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität
zu Bonn.**

Vorgelegt

am 11. Dezember 1937

von

Heinz Prinz

aus Bonn a./Rh.

*) Mit Unterstützung des Westdeutschen Tuberkulose-Forschungs-Instituts.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Doz. Dr. Heymer.

Korreferent: Professor Dr. med. P. Martini.



Die ersten Versuche, durch Flüssigkeitseingabe in den Pleura-raum einen Lungenkollaps zu erzielen oder zu erhalten nach Punktion von Exsudat, sind schon aus dem Jahre 1894 (Lewatschew) und 1895 (James) bekannt. *Forlanini*, der Entdecker des Pneumothorax, hat 1916 neben Einführung von Gasen in die Pleura beim Tier auch Flüssigkeitseinführung versucht. Er brachte Paraffinöl in die Pleura von Kaninchen. Die Versuche wurden aber zugunsten des reinen Pneumothorax aufgegeben. *Schmidt* hat als erster konsequent zu therapeutischen Zwecken die Einführung von 100—300 ccm Öl in die Pleura durchgeführt. *Bernou, Ulrici, Diehl, Scholz, Kremer u. a.* haben die Methode weiter ausgebaut. In Deutschland hat sich dieses Behandlungsverfahren verhältnismäßig spät durchgesetzt, was damit zusammenhängt, daß einmal die strenge Indikation zu einem Oleothorax seltener gegeben ist und in Zweifelsfällen der chirurgische Eingriff, Thorakoplastik und Plombe, eher bevorzugt wurde (*Heymer*).

Die beim Oleothorax zur Verwendung kommenden Öle sind: Das Gomenolöl, das Öl einer Myrtenart, das Jodipin, sowie mineralisches Öl (*Paraffinum liquidum*). Über die Stärke der Reaktionen der verschiedenen Öle auf Pleura und Gesamtorganismus gehen die Meinungen der Forscher auseinander. *Matson* ist der Ansicht, daß mineralisches Öl (*Paraffinum liquidum*) an der Pleura weniger entzündliche Reaktionen hervorrufen würde als pflanzliches Öl. Nach *Munro* soll pflanzliches Öl weniger Reaktionen auf der Pleura erzeugen als mineralisches Öl. Außerdem hat Olivenöl eine stärkere bakterizide Wirkung auf Tuberkelbazillen als flüssiges Paraffin, und er hat den Eindruck, daß diese Tatsache auch in klinischen Beobachtungen ihre Bestätigung findet. Dieselbe tuberkulocide Wirkung ist von *Clerc* experimentell für Gomenol nachgewiesen worden. Überhaupt wird allgemein dem Olivenöl eine stärkere bakterizide Wirkung zugesprochen als dem flüssigen Paraffin. Auf dieser tuberkulociden Wirkung beruhend erklärt *Munro* auch die Hebung des Allgemeinzustandes bei Anwendung des Oleo-

thorax. *Goldenberg* und *Flanchik* geben dem Paraffin den Vorzug. Die Ergebnisse ihrer experimentellen Untersuchungen mit dem Oleothorax an Kaninchen ergaben, daß flüssiges Paraffin eine weniger stark entzündliche Reaktion hervorruft, als das Olivenöl. Zugunsten des Paraffin wertet er auch die Tatsache, daß die beim Kaninchen intrapleural auftretenden chemisch-physikalischen Veränderungen beim flüssigen Paraffin erst später auftreten. *McMahon* injizierte in einen Pneumothoraxraum, dessen Pleura nur wenig verdickt war, 10 ccm 5%iges Gemenolöl.

Er beobachtete einen leichten Erguß und eine durch diese entzündliche Reaktion hervorgerufene Verdickung der Pleura. Exsudatbildung in der Pleurahöhle stellte sich weiterhin bei einem 21jährigen Mann ein, dem 1600 ccm 2½%iges Jodipinöl injiziert wurden (*Waltuch*). Über die weiteren Vor- und Nachteile der Öle ist zu sagen, daß Jodopin den Vorteil hat, infolge eines intensiven Schattens im Röntgenbild bei Ergüssen die Höhe desselben verfolgen zu lassen, demgegenüber aber wieder den Nachteil, daß eine Abgrenzung der kollabierten Lunge erschwert wird. Beim Paraffin liegen die Verhältnisse so, daß zwar eine Abgrenzung gegen die Lunge im Röntgenbild möglich ist, nicht aber gegen Exsudate (*Göbel*). Was die Ausscheidung des Jodes bei Jodipinoleothorax aus dem Körper anlangt, so hat *von Haffner* nachgewiesen, daß sie langsam, zeitlich sehr schwankend und in relativ geringen Mengen vor sich geht. Die Jodausscheidung beträgt etwa das Zwei- bis Sechsfache der Normalwerte. Er warnt aber vor Anwendung des Jodipinoleothorax bei Hyperthyreosen und bei Jodempfindlichkeit.

Es soll nun kurz auf Anwendung und Indikation des Oleothorax eingegangen werden.

I. 1 Der Oleothorax dient als *Kompressionsmittel*, wenn bei bestehender Kaverne der Pneumothorax unwirksam ist, bei starren Kavernen oder Adhäsionen. Voraussetzung ist ein genügend festes Mediastinum, sowie die Aussicht, daß der Öldruck auch tatsächlich die Kaverne trifft. Genaue Kontrolle ist erforderlich und Mißerfolge sind nicht selten. Bei der Anlage des Oleothorax überzeugt man sich durch eine Probeinjektion von wenigen Kubikzentimetern Öl von der Empfindlich-

keit der Pleuren (*Munro, Loewenthal*). Leicht entzündliche Pleuren schließen den Oleothorax aus, erschweren ihn zum mindesten sehr. *Diehl* hat daher vorgeschlagen, bei stark reizbaren Pleuren, bei denen die Durchführung des Oleothorax sehr erschwert wird, die Pleura auf einmal mit größeren Mengen Öl, einige 100 ccm, zu überraschen. Nach *Heymer* sollen im allgemeinen Mengen von 500—600 ccm nicht überschritten werden. Für den Ersatz des kompletten Pneumothorax würde man 1500—2000 ccm Öl eingeben müssen. Bei den feinabgestimmten Druckverhältnissen im Thoraxraum bedeutet das eine unerträgliche Belastung für Kreislauf und Atmungsfunktion (*Heymer*). Es sind zwar einige Fälle beschrieben, wo größere Ölmengen reaktionslos vertragen sein sollen; sie stellen aber sicher Ausnahmen dar. Bei bereits verdickten Pleuren, oder solchen, bei denen bereits eine Exsudatbildung vorausgegangen war, treten kaum noch Reizungen auf. *v. Haffner* berichtet von drei Kranken, bei denen durch den Oleothorax eine Kompression der Lunge erzielt wurde, einer wurde bazillenfrei und erwerbsfähig. *Waltuch* erzielte bei einem Patienten, der an einer rechtsseitigen kavernösen Lungentuberkulose litt, durch die Anlage des Oleothorax in einigen Wochen vollkommene Lösung des adhärennten Oberlappens von der Brustwand und hierdurch einen Kollaps der Kaverne. Umgekehrt wird von einem Fall berichtet, wo Gomenolöl unter gewöhnlichem Druck eine Verwachsung hervorrief (*Stopczyk*).

Auch *Heymer* ist der Ansicht, daß man bei starrwandigen Kavernen, die häufig der Pneumothoraxbehandlung trotzen und durch kein Mittel zum Zusammenfallen zu bringen sind, mit dem Oleothorax, vermöge des hydrostatischen Druckes des Oles, oft Erfolge erzielen kann. Ebenso empfiehlt *Grundner* bei Kavernen, bei denen der Pneumothorax infolge unnachgiebiger Starrheit der Wände und einer ungünstigen Verschiebung der Elastizitätsverhältnisse nicht mehr zu einem Kollaps führen kann, den Oleothorax. Man kann auch versuchen, durch Reizung der Pleura mit wenigen Kubikzentimetern Gomenolöl ein künstliches Exsudat zu erzeugen, um damit eine Kompression der Lunge zu erzielen. Sowohl hierbei, wie beim Oleothorax ist genaue Kontrolle erforderlich, um Komplikationen zu ver-

meiden. Man läßt die gewünschte Ölmenge einfließen unter ständiger Kontrolle des intrapleuraleu Druekes, der die Nullgrenze nicht übersehreiten soll. Es muß einer eventuell eintretenden Exfudation genügend Spielraum gelassen werden, damit es nicht zum Überdruck und damit der Gefahr einer Perforation kommen kann (*Heymer*). Vorbedingung für den Kompressionsoleothorax ist weiterhin ein genügend festes Mediastinum.

Als Komplikation beim Kompressionsoleothorax kann ein Durchbruch in die Lunge zustande kommen, auch gelegentlich bei negativen Drueken. *Kogan* berichtet über einen solchen Fall von Oleothorax, bei dem es zu einem Einbruch in den Bronchialbaum gekommen ist, und zwar trotz negativen Druekes. Allerdings war der vorausgegangene Pneumothorax ohne Exfudat verlaufen, und die Pleura war nicht versehwar-tet. *Hayes* hält den Kompressionsoleothorax für ziemlich gefährlich.

Hierher gehört noch die Erwähnung der Oleothoraxbehandlung, deren Indikation dann gerechtfertigt erscheint, wenn der Pneumothorax zu obliterieren und Verwachsungen mit der Brust einzugehen droht. *Heymer* bezeichnet diesen Vorgang treffend als aufsteigende Versehwartung des Pneumothorax. Diese Anwendung wird von *Göbel* als die Indikation der Oleothoraxbehandlung überhaupt bezeichnet. Auch *Hayes* hält die Aufrechterhaltung des Kollapses, bei eingehendem Pneumothorax infolge Verwachsungen, durch den Oleothorax für die am meisten Erfolg versprechende Methode. *Heymer* hält seine Anwendung hier für die Domäne des Oleothorax. *Loewenthal* hält die Durchführung des Oleothorax für indiziert, wenn bei bestehender Kaverne der Pneumothorax nicht imstande ist, diese zum Kollaps zu bringen. Häufig ist dies der Fall bei älteren Prozessen, bei denen die Kavernenwand ziemlich starr geworden ist und das Lungengewebe seine Elastizität verloren hat. Gute Erfolge mit dem Oleothorax zur Erhaltung oder Verbesserung eines jungen Kollapses, als Kompressionsmittel bei unwirksamem Pneumothorax oder durch Adhäsionen bedingten unvollständigen Kollapses, fahen weiterhin: *Heymer*, *Berki*, *Soffi* und *Häberlin*. Ganz ausgezeichnete Erfolge bei der An-

wendung des Oleothorax bei obliterierenden Pneus hatte *Munro*.

2. Verschiedentlich wurde versucht, durch den Oleothorax den Verschuß einer pleuropulmonalen Perforation zu erreichen. Bei kleinen Fisteln mag ein Versuch indiziert sein (*Hayes, Brown* und *Ballon*), bei großen und breiten Pleurahöhlen-Lungenfisteln ist diese Methode kontraindiziert. (*Ballon, Matson*). *Munro* hält die Gefahr einer Aspiration bei pleuropulmonaler Perforation für so groß, daß er die Ölbehandlung ablehnt und die Thorakoplastik für diese Fälle als die Methode der Wahl ansieht.

II. Komplikationen.

Häufiger sind exsudative Pleurareaktionen verbunden mit Temperatursteigerungen, als Folge des durch das Öl ausgelösten Reizes vorhanden. Exsudatbildung ist sicher häufig, doch wenn sie geringfügig ist, entzieht sie sich vielfach der Feststellung (*Sossi, Hayes, Matson, v. Haffner*). Andere Komplikationen sind: Rückfluß des Öles durch den Stichkanal in die Brustwand-schichten, sowie Entstehung pleuropulmonaler Fisteln und Fett-embolie (*Sossi, Hayes*).

III. Über die Anwendung des Oleothorax bei Empyemen ist zu unterscheiden zwischen:

1. mischinfizierten Empyemen und
2. rein tuberkulösen Empyemen.

ad 1: Die Erfolge bei mischinfizierten Empyemen sind wenig günstig. *Ballon* sah nur wenig Erfolg durch den Oleothorax bei mischinfizierten tuberkulösen Pleuritiden. Die gleiche Beobachtung machte *v. Haffner* bei mischinfizierten Empyemen. Auch *Hayes* und *Brown* sahen selten Erfolge. Andere (*Sossi*) empfehlen die Anwendung des Oleothorax bei mischinfizierten Empyemen. *Berki* hält seine Anwendung hier sogar für besonders wertvoll, weil die konservative Therapie machtlos sei und die chirurgische sich lang hinziehe. Auch *Loewenthal* empfiehlt trotz der nicht eindeutigen Ergebnisse, vor einem größeren operativen Eingriff einen Versuch zu machen.

ad 2: Günstigere Erfolge durch den desinfizierenden Oleothorax sah man schon bei rein tuberkulösen Empyemen. Die

Erfahrungen, die *Munro* in der Behandlung des tuberkulösen Empyems gesammelt hat, veranlassen ihn, den Oleothorax für diese Behandlung anzuspochen. Sehr gute Erfolge verzeichnet auch *v. Haffner*. *Loewenthal* empfiehlt bei eitrigen tuberkulösen Ergüssen Ersatz deselben durch Öl. Dabei wird vielfach so vorgegangen, daß das Exsudat auf einmal abgesaugt (*Matson*) und durch die gleiche Menge Öl ersetzt wird. Andere Autoren ersetzen das Empyem sukzessive durch Öl. *Declava* und *Berger* empfehlen den Oleothorax sogar als Hauptgebiet für das tuberkulöse Pleuraempyem, besonders dann, wenn die konservative Therapie negativ sei und die chirurgische Behandlung vermieden werden soll oder nicht möglich ist. Bei hochfiebernden tuberkulösen Empyemen sah *Häberlin* keine günstigen Erfolge. *Heyes* und *Brown* sahen von dem desinfizierenden Oleothorax selten Erfolge. Bei akuten tuberkulösen Empyemen ziehen sie Punktion des Eiters und Spülung vor.

IV. Bei der Anlage des Oleothorax wird heute im allgemeinen so vorgegangen, daß man die Pleura direkt mit größeren Mengen Öl (200—500 ccm) überflutet (*Diehl*, *Heymer*). Andere (*Munro*, *Loewenthal*) gehen so vor, daß sie zunächst durch Probeinjektionen von kleinen Mengen Öl die Empfindlichkeit der Pleura prüfen. Eine stark reizbare und leicht entzündliche Pleura schließt die Oleothoraxtherapie aus. Bei Pleuren, die bereits verdickt sind, hat man seltener eine Reaktion zu erwarten. Ebenso wenn eine Exsudatbildung vorhergegangen ist, sollen kaum Reizerscheinungen auftreten. Voraussetzung für den Oleothorax ist eine stets exakte Druckregulierung, des weiteren eine wesentlich sorgfältigere Überwachung als beim Pneumothorax. Die Nachfüllung von Öl kann in Abständen von drei bis fünf Monaten vorgenommen werden. Die Resorptionsgeschwindigkeit der Öle ist ungefähr gleich, in vier bis fünf Monaten werden etwa 100 ccm Öl resorbiert (*Göbel*).

V. Zum Schluß sei noch eine interessante Tatsache erwähnt, die von *De Lille*, *Hechter* und *Magrin* beobachtet wurde. Sie sahen des öfteren ein Ansteigen und Unbeweglichwerden des Zwerchfells nach Oleothorax. Auch bei geringen Pleuraergüssen sieht man gelegentlich ein Höbertreten des

Zwerchfells. Diese Wirkung beschreiben sie an zwei Kindern, bei denen wiederholte kleine Ölmengen eingeführt wurden, da der Pneumothorax einzugehen drohte. Sie schlugen daher vor, diese günstige Wirkung durch kleine Ölmengen auszuprobieren, um so eventuell eine Phrenicusoperation unnötig zu machen. Ein Fall von doppelseitigem Oleothorax wird von *Couland* berichtet. Bei einer 27jährigen Frau wurde erst ein totaler linksseitiger Oleothorax angelegt und $\frac{5}{4}$ Jahre später ein partieller rechtsseitiger Oleothorax, der gut vertragen wurde.

Über die experimentellen Erfahrungen mit der Einbringung von Öl in die Brusthöhle liegen eine Reihe Berichte vor. Versuche, die Auskunft geben sollten über die Reaktionen, die das Öl auf die virginelle Pleura ausübt, aber auch über das Schicksal des in die Brusthöhle eingebrachten Öles, wurden ausgeführt von *Bettini*, *Ballon*, *Waitz*, *Diehl u. a.* *Bettini* stellte an Hunden, denen er 100 ccm mit Sudan III gefärbtes Öl in die Pleurahöhle injizierte, fest, daß das Öl über die Lymphgefäße der Pleura resorbiert wird. Die Sektion der Tiere erfolgte nach 3—30 Tagen, und außer Ekstase der Lymph- und Blutgefäße waren keine wesentlichen Veränderungen der Pleuren festzustellen. Zeichen einer Resorption des Öles durch die Blutgefäße war nicht nachweisbar. Das Öl gelangte über die Lymphgefäße der Pleura in den ductus thoracicus, in den kleinen und dann in den großen Kreislauf. Ausgeschieden wurde das Öl durch Lungen und Nieren. In den Lungen fand er noch nach 30 Tagen Fettröpfchen in den Alveolen, außerdem noch reichlich entzündliche Veränderungen. In den Nieren fanden sich Fett-embolien und eine Degeneration des Tubenepithels. Auch in Milz und Leber war reichlich Olivenöl nachzuweisen. *Ballon* kommt bei seinen Versuchen zu dem Schluß, daß wohl eine entzündliche Reaktion eintritt und stellt auch eine mehr oder minder starke serofibrinöse Reaktion fest, sowie evtl. Neubildung von Bindegewebe und Kapillaren.

Bei Versuchen, die *Waitz* an Kaninchen anstellte, konnte er bei allen Tieren eine lebhafte fibrinöse Reaktion der Pleura feststellen. Die Tötung der Tiere erfolgte jeweils nach 24—48 Stunden. Der makroskopische Befund zeigte fibrinöse Beläge und Fibringerinnsel, die in öligem Flüssigkeit lagen. Mikrosko-

pisch zeigte sich, daß die Pleura intakt war, sowohl an der Lunge wie an der Thoraxwand. Es bestand aber eine starke Hyperämie der subpleuralen Gefäßbezirke, subpleurale Rundzelleninfiltrate, perivaskuläre Fibrinaustritte. Auf der Pleuroberfläche fanden sich manchmal zottenartig aussehende fibrinöse Auflagerungen. Erfolgte die Tötung der Tiere nach mehreren Tagen, so fanden sich graduell stärkere Fibrinauflagerungen. Die Versuche führte er teilweise mit Ol. Olivarum und mit 8% Gomenolzusatz aus. Die angewandten Ölmengen betrugen 10—50 ccm.

Über experimentelle Ergebnisse mit 5%igem Jodipinöl berichtet *Diehl*. Kaninchen wurde ein Oleothorax von 60—80 ccm 5%igem Jodipinöl angelegt, und nach der Resorption des Öles wurden die Tiere seziiert. Die Autopsie ergab, daß weder makroskopisch noch mikroskopisch Veränderungen an der Pleura eingetreten waren. Die histologischen Untersuchungen wurden von einem Fachpathologen durchgeführt. Die Pleuren waren glatt und spiegelnd. Bei früher getöteten Tieren fand er, daß die Pleuren mit einer dünnen abwischbaren Schicht verfeisten Öles bedeckt waren.

Um die Erfahrungen dieser experimentellen Ergebnisse zu sichern und zu ergänzen, wurden eine Reihe von Versuchen ausgeführt.

Als Versuchstiere dienten in allen Fällen Meerfischweichen, alles ausgewachsene besonders kräftige Tiere. Die Tötung der Tiere erfolgte stets durch Nackenschlag. Die zur Verwendung kommenden Öle waren das 2½%ige Jodipin und das 5%ige Gomenolöl. Die zu den Injektionen verwandten Ölmengen betrugen 3,5—5 ccm. Es sollte einmal festgestellt werden, wie die Pleuren auf die verschiedenen Öle reagieren und ob eventuell die beiden Ölarten abweichende Reaktionen an den Pleuren hinterließen. Bei allen Tieren wurde ein rechtsseitiger Oleothorax angelegt. Die Sektion erfolgte nach 8 Tagen bis 3 Wochen. Einmal wurden Gomenol und Jodipin intraperitoneal gegeben. Von den Pleuren aller Tiere wurden mikroskopische Präparate angefertigt. Und zwar wurden Schnitte aus der Thoraxwand und der Lunge hergestellt. Gefärbt wurden die Präparate mit Hämatoxylin-Eosin.

Um aber entzündliche Reaktionen an der Pleura und Lunge des Meerfchweinchens beurteilen zu können, ist eine genaue histologische Kenntnis der Meerfchweinchenlunge notwendig.

Betrachtet man histologische Schnitte der Lunge, so fällt einem zunächst die Dichte des Präparates auf, wenn man ihm die Menschenlunge gegenüberstellt. Das liegt daran, daß die Alveolarwände dicker sind als beim Menschen. Die größere Dicke wird dadurch erzeugt, daß sie einerseits reicher an elastischem Gewebe sind und anderseits daher, daß zahlreiche Leukozyten und Lymphozyten dort eingelagert sind. Eine Verdichtung des Lungenbildes kann man also nicht so ohne weiteres auf eine entzündliche Verdickung der Alveolarwände und Septen zurückführen. Weiterhin ist wichtig die Kenntnis über Umfang und Ausdehnung des lymphatischen Gewebes in der Meerfchweinchenlunge. Einmal sieht man scharf begrenzte Häufchen und zweitens mehr diffuse Ansammlungen von leucocyären Elementen. Auf den Reiz des Öles hin kommt es dann zu einer starken Ausdehnung der Knötchen. Atelektatische Lungenbezirke gehören ebenfalls zum normalen Lungenbild. Infolge einer außergewöhnlich starken Bronchialmuskulatur kann das Meerfchweinchen willkürlich Teile seiner Lunge außer Funktion setzen, d. h. von der Luftzufuhr absperren. Wichtig ist noch die Kenntnis des ligamentum pulmonale, welches jederseits vom Zwerchfell als dünnes Häutchen zu den Unterlappen führt und mit einer entzündlichen Reaktion nicht verwechselt werden darf. Normalerweise findet man bei der Sektion von Meerfchweinchen, daß deren Lungen stets sehr wenig bluthaltig und stark retrahiert sind. Erfolgt nun der Tod der Tiere durch Nackenschlag, so kommt es in vielen Fällen zu Blutungen in der Lunge. Dieses Blut stammt, wenn die Tiere durch Nackenschlag getötet wurden, fast stets aus der Nase und wird dann in Bronchien und Alveolen aspiriert.

Die experimentellen Untersuchungen gliedern sich in drei Abschnitte.

1. In der ersten Versuchsreihe wurde an vier Meerfchweinchen ein rechtsseitiger Oleothorax mit 3,5 ccm 5%igem Gomenolöl angelegt. Die Sektion erfolgte nach 8 Tagen. Makroskopisch zeigten sich an Pleuren und Lungen keine Veränderungen.

Beide Pleuren, sowohl *pleura parietalis* wie *pleura visceralis* waren glatt und spiegelnd, und es war keine Injektion an ihnen zu sehen. Die Lunge war retrahiert und blutleer. In beiden Brusthöhlen fand sich Öl, rechts mehr wie links, welches etwas verseift war. Es war noch der typische Gomenolgeruch erkennbar.

An den mikroskopischen Schnitten, die durch die Thoraxwand und die Lunge gelegt waren, erschienen die Pleuren vollkommen intakt. Entzündliche Veränderungen in der Lunge konnten nicht nachgewiesen werden. Eine Vermehrung der leukocytären Elemente war gegenüber normalen Lungen Schnitten nicht eingetreten, ebenso keine Vergrößerung der Lymphknötchen.

2. Des weiteren wurde bei vier Tieren dieselbe Menge 5% Gomenolöl intraperitoneal gegeben. Die Sektion dieser Tiere erfolgte nach 8 Tagen bis 4 Wochen. Da sowohl der peritoneale Überzug als auch die Pleuren seröse Häute sind, so sollte auch hier Verhalten und Reaktion des Peritoneums erforscht werden. Gleichzeitig wurden an 3 Meerschweinchen 5 ccm 2½%iges Jodipin intraperitoneal injiziert. Die Autopsie dieser Tiere erfolgte nach 8 Tagen, 14 Tagen und 4 Wochen. In allen Fällen wurden mikroskopische Schnitte von der Bauchwand angefertigt. Nach Eröffnung der Bauchhöhle zeigten sich bei keinem Tier entzündliche Veränderungen. Das Peritoneum war nicht injiziert, glatt und glänzend, ebenso die Därme. Die injizierte Ölmenge konnte nach 8 Tagen schon nicht mehr in derselben Menge gefunden werden. Nach vier Wochen war nur noch eine minimale Flüssigkeitsmenge in der Bauchhöhle vorhanden. In allen Fällen konnte auch eine teilweise Verseifung des Öles wahrgenommen werden, die desto stärker in Erscheinung trat, je später die Tiere zur Sektion kamen. Der Gomenolgeruch war nur bis zur dritten Woche noch gut zu erkennen. In der vierten Woche nicht mehr. Da Jodipin keinen so charakteristischen Geruch wie Gomenolöl hat, so konnte an ihm diese Tatsache nicht wahrgenommen werden.

3. In der dritten Versuchsreihe sollte gleichzeitig die Wirkung des Gomenols und des Jodipins erforscht werden. An zwei Meerschweinchen wurde ein rechtsseitiger Oleothorax mit

5 ccm 5%igem Gomenolöl angelegt. Analog wurde bei zwei anderen Tieren 5 ccm 2¹/₂%iges Jodipinöl angewandt.

Nach 10 Tagen wurde ein Tier mit Jodipinoleothorax feziert. Nach Eröffnung der Brusthöhle waren makroskopisch deutliche Veränderungen zu sehen. Zunächst muß gesagt werden, daß auf beiden Thoraxseiten der gleiche Befund erhoben wurde. Rechts injiziertes Öl muß also teilweise nach links hinüber gewandert sein, um dort dieselben entzündlichen Reaktionen zu erzeugen. Der Befund, daß rechts injiziertes Öl bei der Sektion teilweise auf der linken Thoraxseite gefunden wurde, wurde auch bei früheren Versuchen immer festgestellt. Daß das Öl nicht erst bei der Sektion herübergeflossen war, bewies die Tatsache, daß bei Vorhandensein entzündlicher Reaktionen diese auf beiden Seiten gefunden wurden.

Die rein mechanische Wirkung des Oleothorax von 5 ccm hatte eine deutliche Linksverlagerung des Herzens und der Mediaftinalorgane zur Folge gehabt. Die Lungen beider Seiten waren düsterrot gefärbt und nicht retrahiert. Pleura costalis und pulmonalis waren mattglänzend. Die Pleura costalis war ziemlich stark injiziert, in den vorderen Partien stärker als in den hinteren Partien und mit fibrinösen Belägen bedeckt. Die pleura pulmonalis hatte nur wenige fibrinöse Auflagerungen, die aber ein eigentümlich warzenartiges Aussehen hatten. Verklebungen zwischen pleura costalis und pulmonalis, sowie bindegewebige Schwarten zwischen beiden bestanden nicht. In der Thoraxhöhle selbst befanden sich milchig trübe Blasen, die ebenso gefärbte krümelige Massen enthielten.

An den mikroskopischen Schnitten erschien die Pleura intakt. Es bestand aber eine ausgeprochene Hyperämie, perivaskuläre und subpleurale Leukocytenansammlungen.

Ein einen Tag später feziertes Tier mit Gomenololeothorax aus derselben Versuchsreihe zeigte einen fast normalen Befund. Makroskopisch sah man Verdrängung der Mediaftinalorgane nach links, in beiden Thoraxhälften ölige Emulsionen mit weißen, krümeligen Massen. Lungen ziemlich blutleer und retrahiert. An den mikroskopischen Schnitten waren die Pleuren vollkommen intakt. Deutliche entzündliche Veränderungen

waren keine nachweisbar. Es bestand nur leichte Hyperämie und angedeutete perivaskuläre Leukocytenansammlungen.

Nach 20 Tagen erfolgte dann die Sektion der beiden anderen aus dieser Versuchsreihe stammenden Tiere. Bei beiden fand sich makroskopisch wiederum eine Verdrängung der Mediastinalorgane nach links, ölige Emulsionen und in Blasen eingeschlossene krümelige Massen in beiden Thoraxhälften, Lungen düsterrot gefärbt, nicht retrahiert, Pleuren stark injiziert und mit fibrinösen Belägen bedeckt. Auflagerungen auf der pleura pulmonalis hatten ein zotten- bis warzenähnliches Aussehen. Bei Jodipinoleothorax fanden sich zarte bindegewebige Stränge zwischen pleura costalis und pulmonalis. Gomenolgeruch war nicht mehr sicher nachweisbar.

Mikroskopisch fanden sich deutlich entzündliche Veränderungen an der Lunge, starke Hyperämie, subpleurale und perivaskuläre Leukocyteninfiltrate. Auf den Pleuren fanden sich verschiedentlich fibrinöse Auflagerungen. Die Pleuren selbst aber waren intakt.

Zum Schluß sollte dann in einer weiteren Versuchsanordnung geprüft werden, ob dem Gomenol eine tuberkulocide Wirkung auf Tuberkelbazillen zugesprochen werden kann, ob sie größer oder geringer ist als beim Jodipin. Hierbei wurde dann so vorgegangen, daß mehrere Öfen Kulturbazillen auf den Boden eines Reagensglases gebracht wurden. Darüber wurde dann 5%iges Gomenol resp. 2 $\frac{1}{2}$ %iges Jodipin etwa 3 bis 4 cm hoch eingegossen. Mehrmals am Tage wurden die Bazillen in den Gläsern aufgewirbelt. In verschiedenen Zeiträumen wurden dann die unter der Einwirkung des Öles verbliebenen Kulturbazillen auf Nährböden verimpft. Und zwar wurden stets zwei Nährböden hierzu benutzt, der nach *Petragnani* und *Guerricy*. Letzterer ist eine neuere amerikanische Modifikation und soll nach Angabe des Herstellers den Vorzug haben, schon nach vier Tagen ein Bazillenwachstum erkennen zu lassen. Nach unseren Erfahrungen kann aber gegenüber dem Nährboden nach *Petragnani* kein Vorzug festgestellt werden.

Die Verimpfung auf die Nährböden wurde dann so vorgenommen, daß die so verhandelten Bazillen nach einmal

24 Stunden, nach 6 Tagen und nach 12 Tagen verimpft wurden. Die Nährböden befanden sich dauernd unter einer Temperatur von 37° Celsius. Die 24-Stunden-Kulturbazillen zeigten in ihrem Wachstum keinen Unterschied in bezug auf die beiden Öle. Anders verhielten sich die Bazillen, die 6 Tage der Öleinwirkung ausgesetzt waren. Die der Gomenoleinwirkung ausgesetzten Bazillen zeigten auf den Nährböden kein so starkes Umsichgreifen wie diejenigen, die dieselbe Zeit unter der Jodipineinwirkung gestanden hatten. Bei den nach 20 Tagen verimpften Bazillen wurde die gleiche Wahrnehmung gemacht, wobei die Wachstumsunterschiede etwa die gleichen waren.

Zusammenfassung.

1. Experimentelle Untersuchungen zeigen, daß die Einbringung von Gomenol- und Jodipinöl in der Pleura des Meerfchweinchens an der Pleura selbst nicht zu wesentlichen Veränderungen führt, außer entzündlichen Reaktionen. Dieselbe Feststellung bringen auch die im Schrifttum niedergelegten Erfahrungen.

2. Die entzündlichen Reaktionen traten beim Gomenolöl erst nach 8 Tagen auf, während sie beim Jodipin zu dieser Zeit schon bestanden. Dabei sind diese Reaktionen in gleichen Zeitabständen beim Gomenolöl geringer als beim Jodipin. Jodipin setzt also stärkere entzündliche Reaktionen als Gomenolöl.

Daß die entzündlichen Reaktionen bei unseren Versuchen an Meerfchweinchen erst nach 8 Tagen, wie es mit Sicherheit beim Gomenolöl der Fall war, eintreten, hat seinen Grund darin, daß die Pleura des Meerfchweinchens widerstandsfähiger ist als diejenige des Kaninchens.

3. Das Peritoneum erwies sich den Einwirkungen der Öle gegenüber sehr resistent. Es traten nachweisbare entzündliche Veränderungen nicht ein.

4. Gomenolöl hat gegenüber dem Jodipin eine stärkere tuberkulocide Wirkung.

5. Das in die Brusthöhle eingebrachte Öl wird zum Teil resorbiert und eine gewisse Menge Öl verseift.

6. In die rechte Thoraxseite injiziertes Öl wanderte bei allen Meerfchweinchen teilweise nach der linken Seite. Die letzte Ursache dafür kann nicht angegeben werden.

7. Der typische Geruch des Gomenolöls konnte bei Injektionen von 5 ccm nach der vierten Woche nicht mehr wahrgenommen werden.

Es sei mir an dieser Stelle gestattet, Herrn Chefarzt Dr. *Schulte-Tigges* für die Überlassung des Themas und seine freundliche Unterstützung herzlichst zu danken.

Literatur.

- Armand-Delille, P., P. Hechter et A. Magrin.
Sur l'action phreno-inhabitrice certains oleothorax.
Revue de la Tbc., III. s. 13, 287—291.
- Ballon, H.: Some experiences with oleothorax.
Amer. J. Surg. N. s. 16, 1—11 (1932).
- Berki, B.: Die Oleothoraxbehandlung der Empyeme.
Therapia (Budapest) 8, 267—268 (1931).
- Bettini, D.: Richerchesperimentali sull' oleothorace.
Riv. Pat. e Clin. Tbc. 7, 400—419 (1933).
- Declava, G., G. Berger: Contributo aal cura delle affezioni
pleuropulmonari con l'oleothorace.
Riv. Pat. Appar. respirat. I, 68—79 (1932).
- Diehl: Die physikalischen und physiologischen Grundlagen
des Oleothorax und ihre Folgerungen für die Klinik.
Zschr. Tbc. 53, 514.
— Doppelseitiger Pneumothorax und Oleothorax und ihre
Technik.
Beitr. Klin. Tbk. 68, 174.
- Giffel-Schmidt, H.: Die Lungentuberkulose.
Thieme, Leipzig 1933.
- Göbel, W.: Beiträge zur Oleothoraxbehandlung.
Z. Tbk. 64, 363—371 (1932).
- Grundner, G.: Beitrag zur Heilung großer Kavernen durch
künstlich provoziertes Exsudat und Oleothorax.
Prakt. Tbk. bl. H. II, 168—177 (1931).
- Goldenberg, J., and S. J. Flanchik: The superiority of
mineral oil over olive oil in oleothorax. Experimentell
studies.
Amer. Rev. Tbc. 26, 424—426 (1932).
- Haberland, H. F. O.: Die operative Technik des Tierex-
periments.
Urban u. Schwarzenberg, Berlin 1934.
- Häberlin, F.: Über den Oleothorax.
Schweiz. med. Wschr. 1932, II, 732—734.
- von Haffner, G.: Jodresorption beim Jodipinoleothorax.
Beitr. klin. Tbk. 83, 92—96 (1933).
— Beitrag zur Frage der Oleothoraxtherapie.
Beitr. klin. Tbk. 79, 485—495 (1933).
- Hayes, J. N. and Lawrason Brown: Experiencies with Oleo-
thorax.
J. thorac. Surg 3 I—II (1933).

- Heymer, A.: Ergänzungsbehandlung des Pneumothorax.
Die med. Welt. 1937, S. 349.
- Jaffe, R.: Anatomie und Pathologie der Spontanerkrankungen der kleinen Laboratoriumstiere.
Springer, Berlin 1931.
- Kogan: Ein Fall von Bronchialfistelbildung nach dem Oleothorax.
Zfchr. f. Tbk. Bd. 61, S. 19 (1931).
- Loewenthal: Klinische Erfahrungen mit dem Oleothorax.
Beitr. Klin. Tbk. 72, 575.
- Mc Mahon, B. T.: Therapeutic pleural effusions by oleothorax.
Amer. Rev. Tbc. 26, 424—426 (1932).
- Munro, N. M.: Oleothorax with observations on 20 cases.
Brit. med. J. Nr. 3716, 554—558 (1932).
- Sossi, O.: L'oleothorax come mezzo antisettico e collassoterapico.
Indikationi — Tecnica — Strumentario. Padova: Antonio Milani 1931.
- Thomson: Ein neuer Apparat für die Oleothoraxtherapie als Ergänzung zur Pneumothoraxtherapie.
Beitr. Klin. Tbk. 75, 491.
- Ulrici, H.: Diagnostik und Therapie der Lungen- und Kehlkopftherapie.
II. Auflage, Springer, Berlin 1933.
- Waitz: Experimentelles zum Oleothorax.
Beitr. Klin. Tbk. 73, 59.
— Experimentelles zum Oleothorax.
Beitr. Klin. Tbk. 78, 517.
- Waltuch, E.: Verwachsungslösung durch Oleothorax.
Prakt. Tbk. bl. 7, 21—27 (1933).
— Zur Indikation und Technik des Oleothorax.
Zfchr. Tbk. 60, 144.
- Wiefe: Der derzeitige Stand der Lungenkollapstherapie im Kindesalter.
Zfchr. Tbk. 60, 406.
-

Lebenslauf.

Am 19. September 1910 wurde ich, Heinz Prinz, als Sohn des Schreinermeisters Theo Prinz und seiner Ehefrau Anna geborene Müller in Hennef (Sieg) geboren. Ich besuchte vier Jahre die Karlschule in Bonn, ein Jahr die Vorschule und ging dann zur städtischen Oberrealschule in Bonn. Ab Obersekunda ging ich Ostern 1928 zum Evangelischen Pädagogium in Bad Godesberg. Dasselbst bestand ich Ostern 1931 die Reifeprüfung. Ich wandte mich dann dem Studium der Medizin zu und besuchte vom Sommer-Semester 1931 bis zum Sommer-Semester 1937 die Universität Bonn. Während meines Studiums habe ich ein Jahr Wehrdienst freiwillig abgeleistet. Am 24. Februar 1934 bestand ich die ärztliche Vorprüfung. Die klinischen Semester verbrachte ich in Bonn und bestand am 17. Dez. 1937 das ärztliche Staatsexamen.
